

ZALVISO® System

- Nehmen Sie eine Dosis ein, wenn Sie sie zur Linderung Ihrer Schmerzen brauchen oder vor einer Tätigkeit, bei der sich die Schmerzen verschlimmern könnten.
- Zu Ihrer Sicherheit ist das System so eingestellt, dass Sie zwischen einer Dosis und der nächsten mindestens 20 Minuten warten müssen.
- Geben Sie die Tabletten **NICHT** an andere Personen weiter. Sie dürfen die Tabletten auch **NICHT** in die Hand abgeben, um sie später einzunehmen.
- Das System darf **NICHT** mit in die Dusche genommen oder in eine Flüssigkeit getaucht werden. Wenn Sie Flüssigkeit auf das System verschüttet haben, verständigen Sie das Krankenpflegepersonal.

Wann kann ich eine Dosis einnehmen?



Dosis verfügbar (grüne LED-Anzeige)


Sie können bei Bedarf eine Dosis einnehmen.



Keine Dosis verfügbar (blaue LED-Anzeige)

Sie können zurzeit keine Dosis einnehmen.

Wie soll ich meine Dosis einnehmen?



Entfernen Sie die Schutzkappe und nehmen Sie das System in die Hand, an der Sie das Daumenpflaster tragen.



Die blaue Sensortaste **NICHT** mit Ihrem Daumen berühren oder drücken, bis die Spitze der Dispensiereinheit unter der Zunge liegt.



Halten Sie zur Abgabe der Tablette das System möglichst aufrecht.

Legen Sie zunächst die Spitze der Dispensiereinheit **UNTER** die Zunge und drücken Sie **DANACH** mit Ihrem Daumen auf die Sensortaste.



Achten Sie darauf, dass während der Abgabe der Tablette die Spitze der Dispensiereinheit **NICHT** nach unten gedrückt wird.



Behalten Sie die Spitze der Dispensiereinheit so lange unter der Zunge, bis Sie den Signalton für die Abgabe hören und spüren, dass die Vibration des Motors aufgehört hat.



Bewahren Sie das System zwischen zwei Abgaben in der Halterung auf, um die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Tablette versehentlich abgegeben wird, so gering wie möglich zu halten.



Die Tablette **NICHT** kauen oder schlucken.



Nach der Einnahme einer Dosis 10 Minuten lang **NICHT** essen oder trinken und so wenig wie möglich reden.



Bei anhaltendem Signalton und anhaltendem Leuchten des Systems zwischen zwei Dosisabgaben das Krankenpflegepersonal verständigen.



Wenn Sie bei der Einnahme einer Dosis Probleme haben oder die Tablette nicht unter der Zunge behalten können, wenden Sie sich an das Krankenpflegepersonal.



Verständigen Sie das Krankenpflegepersonal, wenn Sie versehentlich eine Tablette abgegeben haben, ohne dass Sie eine Dosis einnehmen wollten, oder wenn Sie sehen, dass eine oder mehrere Tabletten lose sind.

